{qluetip title=[Planorbarius corneus]}

{/qluetip}
(Linnaeus, 1758)

Piccolo gasteropode che negli ultimi anni sta avendo notevole diffusione in ambito acquariofilo, complice la presenza a listino di numerose selezioni d'allevamento dalle colorazioni spesso irresistibili. Innocuo, detrivoro, molto attivo sia di giorno che di notte, non è tuttavia propriamente adatto all'acquario tropicale richiedendo temperature inferiori.

Fotogallery

Nome Scientifico:

{qluetip title=[Planorbarius corneus]}

{/qluetip} (sin.: *{qluetip title=[Coretus corneus]}*

{/qluetip})

Nomi Comuni:

Planorba maggiore
Porpora d'acqua dolce
Planorbis corneus
Great ramshorn snail

Famiglia:

Planorbidae

Origine:

Europa ed Asia occidentale. Successivamente diffusa ad opera dell'uomo anche in molte altre aree geografiche a clima sub-tropicale e temperato.

Morfologia:

corpo molle di colore marrone scuro tendende spesso al rossiccio, piede mobile di piccole dimensioni, dal capo dipartono due sottili tentacoli cefalici alla cui base sono collocati gli occhi. La conchiglia è sinistrosa ed a sviluppo radiale, presenta in pratica le spire avvolte le une sulle

altre a formare pressochè un unico piano. L'incisione di separazione delle spire è molto profonda, il numero massimo di spire che possono prodursi nell'arco di un intero ciclo vitale è 4,5 / 5. Quando *P. corneus* è in movimento la conchglia viene mantenuta in verticale, leggermente piegata a sinistra. L'opercolo è assente.

In commercio si trovano soprattutto selezioni d'allevamento (come quelle mostrate in questo articolo), con colorazioni della conchiglia e del corpo molle per tutti i gusti. Le selezioni più diffuse sono sicuramente la "**red**", la "**pink**", seguite dalla "**blue**" e dalla "**Leopard**", ma ce ne sono ancora molte altre in circolazione...

E' stata riconosciuta ufficialmente una sottospecie, ***{qluetip title=[Planorbarius corneus]}***



Badis badis

Tetraodon, i Cobitidi dei Generi *Botia* e *Chromobotia* esempio

Planorbarius corneus