

## Tateurndina ocellicauda

Scritto da Andrea Perotti

Domenica 01 Gennaio 2012 18:21 - Ultimo aggiornamento Domenica 01 Gennaio 2012 18:28

---

***{qluetip title=[ [Tateurndina ocellicauda](#) ]}***



***{/qluetip}***

(Nichols, 1955)



## Tateurndina ocellicauda

Scritto da Andrea Perotti

Domenica 01 Gennaio 2012 18:21 - Ultimo aggiornamento Domenica 01 Gennaio 2012 18:28

---

Bellissimo e particolare pesciolino originario dell'isola di Nuova Guinea. Vivace e dalla livrea davvero spettacolare. Tra i maschi sessualmente maturi sussiste un certa territorialità legata al controllo dei punti scelti per la deposizione. La sua tecnica riproduttiva è molto interessante da osservare. Livello di difficoltà medio, per i principianti è meglio evitare gli esemplari di cattura in quanto risultano piuttosto esigenti in termini di alimentazione.



Nome scientifico:

*[Tateurndina ocellicauda](#)* 

Nomi comuni:

in Italia nessuno, nel circuito commerciale internazionale ha invece vari nomi comuni...

Peacock Gudgeon  
Peacock-eye Gudgeon  
Peacock Goby  
Rainbow Gudgeon  
Eye-spot Sleeper

Famiglia:

Eleotridae

Luogo d'origine:

## Tateurndina ocellicauda

Scritto da Andrea Perotti

Domenica 01 Gennaio 2012 18:21 - Ultimo aggiornamento Domenica 01 Gennaio 2012 18:28

---

Asia ed Oceania [reperibile nell'isola di Nuova Guinea, la seconda isola al mondo per estensione, la cui parte occidentale (Nuova Guinea Occidentale) appartiene all'Asia in quanto amministrata dall'Indonesia, mentre la parte orientale (stato indipendente di Papua Nuova Guinea) risulta appartenente all'Oceania].

### Morfologia:

corpo snello e allungato, compresso lateralmente in corrispondenza del peduncolo caudale. La testa presenta dimensioni e forme differenti tra femmina e maschio, più allungata e piccola nelle femmine, più grande, gibbosa a livello della fronte e con mandibola più pronunciata nei maschi. Gli occhi sono leggermente sporgenti e presentano tonalità grigio/azzurra sul contorno dell'iride. La livrea di fondo corporea è azzurro/grigia, con presenza talvolta di riflessi rosati e con bellissime iridescenze blu elettrico, la tonalità tende al giallino nella zona ventrale (soprattutto nelle femmine) ed al grigio/verde nella zona anteriore del dorso. Lateralmente tutto il corpo, dagli opercoli branchiali al peduncolo caudale, presenta screziature intermittenti e diposte in verticale, di color rosso/arancio, la cui tonalità si fa più intensa durante le fasi riproduttive. In corrispondenza del termine del peduncolo caudale è presente una caratteristica macchia nera a forma di ocello, da cui il nome dato alla specie. Le pinne sono tutte ben sviluppate, con colorazione turchese e punteggiature rosso/arancio, e presentano sulla parte finale dei raggi una intensa colorazione gialla, con estremità nere nella anale. La pinna caudale ha forma tondeggiante, quella anale ha un'attaccatura molto estesa, quanto la metà della lunghezza dell'intero aninale, le dorsali sono due, la prima con attaccatura breve e la seconda con attaccatura molto estesa risultando in pratica speculare rispetto a quella anale.

### Dimorfismo sessuale:

in esemplari allo stadio giovanile è quasi impossibile distinguere i sessi, nella forma adulta invece il dimorfismo sessuale diviene lampante ed inequivocabile, i maschi infatti hanno la testa di dimensione maggiore con una evidente gibbosità a livello della fronte, ed inoltre risultano leggermente più lunghi.

# Tateurndina ocellicauda

Scritto da Andrea Perotti

Domenica 01 Gennaio 2012 18:21 - Ultimo aggiornamento Domenica 01 Gennaio 2012 18:28

---



[ocellicauda](#) [Tateurndina](#)