{qluetip title=[Lymnaea auricularia]}

{/qluetip}
(Linnaeus, 1758)



[illegible]

Nome scientifico: *{quotep title=[* *Lymnaea auricularia* *]}*



Sinonimi: *{quotep title=[* *Radix auricularia* *]}*

{/quotep} (Linnaeus, 1758) [1][5][6] *{quotep title=[* *Helix auricularia* *]}*

{/quotep} (Linnaeus, 1758) [1][6] *{quotep title=[* *Limnaea auricularia* *]}*



{/quotep} [1][6] *{quotep title=[* *Lymnaea trencalaeonis* *]}*

{/quotep} (Gassies, 1856) [2] ... quindi meglio chiamarle semplicemente "forme" [2]);

... dell'Asia [1], attualmente è rinvenibile in Croazia [1][2][6], Rep. Ceca [1]

[illegible]









[illegible] *Pterophyllum* *scalare* [illegible]

{/qluetip}!) e a pesci notoriamente ghiotti di lumache come ad esempio *{qluetip title=[* badis Badis *]}*

{/qluetip} i pesci palla del Genere *Tetraodon*, i Cobitidi dei Generi *Botia* e *Chromobotia*

]} Anentome helena di grandi dimensioni, oltre ovviamente a lumache predatrici, come ad esempio

{/qluetip}. Sta[illegible] sulle [illegible] dell'acqua [illegible] più consoni alla specie, evitate l'abbinamento

bonelli *Perca fluviatilis* (Pesce persico europeo), *{qluetip title=[* Padogobius *]}*

{/qluetip} (sin. *{qluetip title=[* Padogobius martensii *]}*

[illegible] *Astacus astacus* (Gambero di fiume europeo) [illegible] i suoi principali [illegible]