{qluetip title=[Chilodus punctatus]}

{/qluetip}
(Müller & Troschel, 1844)



Particolarissimo pesce amazzonico, nuota e staziona tenendosi sempre in posizione obliqua, con la testa verso il basso e la caudale in alto. Va tenuto in piccoli gruppetti in acquari poco illuminati, con acqua poco mossa e con fondo scuro. Si nutre prevalentemente di alghe. Piuttosto delicato in quanto mal tollera la presenza di elementi inquinanti, instabilità di valori e

sbalzi di temperatura. Livello di difficoltà: medio.

Nome scientifico:

{qluetip title=[Chilodus punctatus]}

{/qluetip} (Sin.: *{qluetip title=[Chaenotropus punctatus]}*

{/qluetip}, *{qluetip title=[Citharinus chilodus]}*

{/qluetip})

Nomi comuni:

Spotted headstander
Pesce dalla testa bassa

Famiglia:

Chilodontidae (nota: da alcuni Istituti tassonomici e da molti studiosi quella dei Chilodontidi viene considerata una Sottofamiglia della Famiglia Anostomidae)

Luogo d'origine:

America meridionale (Ecuador, Perù, Brasile, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Guyana, Suriname).

Morfologia:

corpo affusolato e compresso lateralmente, con peduncolo caudale allungato e muso appuntito. Profilo dorsale arcuato, bocca piccola in posizione terminale centrale, parte superiore dell'iride color rosso fuoco. Pinne tutte ben sviluppate e color grigio chiaro, con la caudale quasi trasparente e molto bipolata e la dorsale alta, con attaccatura ridotta e macchiettata di nero, soprattutto in punta. E' presente anche la pinna adiposa. Colorazione corporea di fondo grigio chiaro, a volte tendente al giallo/verde soprattutto nella parte al di sopra della linea laterale, con presenza a seconda delle differenti zone geografiche di prelievo di sfumature giallo oro e/o azzurre. Squame grandi ben profilate, con bordature e interstizi color nero. In pratica il pesce se

visto lateralmente appare reticolato ricordando vagamente una scacchiera, con tante macchiette nere equidistanti su sfondo chiaro. In corrispondenza della linea laterale una striscia nera percorre l'intera lunghezza del pesce, dalla punta del muso fino all'attaccatura della pinna caudale, prolungandosi a volte anche sulla pinna caudale stessa; questa striscia però non è sempre totalmente ben visibile, si evidenzia o si sbiadisce a seconda dello stato d'umore del pesce e della sua attività sessuale, in particolare a volte nelle femmine in fase d'accoppiamento può arrivare a ridursi a sole due macchiette circolari, delle quali una in corrispondenza dell'opercolo branchiale e l'altra posta verticalmente sotto l'attaccatura della pinna dorsale. Il dorso, se si osserva il pesce dall'alto, è scuro, color marrone verdognolo.
La vera particolarità di questo pesce è comunque la sua vescica natatoria, grande e in posizione molto arretrata, è questa particolarità a generare nell'animale la posizione obliqua a testa in giù.

Nota: è presente una sottospecie, *{qluetip title=[Chilodus punctatus]}*

{/qluetip} zunevei, distinguibile per la totale assenza della striscia scura in corrispondenza della linea laterale.

Dimorfismo sessuale:

apprezzabile solo in fase riproduttiva, quando la macchiettatura del maschio diviene più marcata ed il ventre della femmina più arrotondato e voluminoso. Ho letto spesso di differenze di lunghezza nei primi raggi della pinna dorsale, più allungati nei maschi rispetto alle femmine, ma io negli esemplari da me osservati non ho mai notato questa differenza.

Dimensioni:

in natura possono raggiungere i 12 cm, in acquario difficilmente superano i 9 cm.



[redacted] *Pentlo*

{/qluetip} o *{qluetip title=[Limnobium laevigatum]}*

[redacted] *Chilodus punctatus* [redacted]

[redacted] **Acquarishop** [redacted]