

Mikrogeophagus altispinosus

Scritto da Andrea Perotti

Giovedì 29 Marzo 2012 00:11 - Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:47

{qluetip title=[[Mikrogeophagus altispinosus](#)]}



{/qluetip}

(Haseman, 1911)



Piccolo Ciclode di origine amazzonica, robusto e facile da riprodurre. Può essere inserito anche

Mikrogeophagus altispinosus

Scritto da Andrea Perotti

Giovedì 29 Marzo 2012 00:11 - Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:47

in vasche di comunità, ma attenzione alla fase riproduttiva, in cui mostra una crescente territorialità verso chiunque si avvicini al luogo di deposizione prima ed alla prole successivamente. Fantastiche le cure parentali riservate ai piccoli da parte dei genitori, ma per apprezzarle appieno occorre tenere questi ciclidi in una vasca monospecifica ad essi totalmente dedicata.

Livello di difficoltà ridotto, specie consigliabile anche a neofiti dell'acquario.



Nome scientifico:

[Mikrogeophagus altispinosus](#) 

(sin. [Mikrogeophagus altispinosus](#) 

)

Note al nome scientifico:

la storia tassonomica del Genere Mikrogeophagus è una delle più contorte in assoluto ed ancora adesso permane incertezza sulla corretta identificazione del Genere. Senza entrare troppo nel dettaglio vi invito, se interessati, a consultare le note inserite nella scheda dedicata al

[Mikrogeophagus ramirezi](#) 

, basta cliccare sul nome per accedere all'articolo.

Nomi comuni:

Ram boliviano
Bolivian ram

Mikrogeophagus altispinosus

Scritto da Andrea Perotti

Giovedì 29 Marzo 2012 00:11 - Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:47

Ruby Clown Cichlid

Famiglia:

Cichlidae

Luogo d'origine:

America meridionale (Amazzonia meridionale, rinvenibile nel Rio Mamoré, in Bolivia, e nel Rio Guaporé che rappresenta il confine naturale tra Bolivia e Brasile).

Morfologia:

corpo stretto (soprattutto in prossimità del peduncolo caudale) ed alto se osservato frontalmente, ampio ed ovale se osservato lateralmente. Le pinne sono tutte ben sviluppate, in particolare dorsale ed anale, e mostrano una colorazione di fondo tenue tendente in genere ad un giallo/arancio appena percepibile. I primi raggi della dorsale però sono neri, mentre i raggi più esterni della caudale sono intensamente colorati di arancio/rosso. In fase riproduttiva inoltre risultano intensamente colorate di arancio/rosso anche le pinne ventrali, quella anale e la parte superiore dei raggi della pinna dorsale. La livrea di fondo del corpo è chiara e piuttosto variabile, si va dal bianco perla con riflessi azzurri/violacei al marroncino tendente all'arancio nella zona del petto e degli opercoli branchiali, ed è attraversata da minuscole puntinature molto scure, tendenti al nero. Su ogni lato, poco sotto l'attaccatura della pinna dorsale, è presente un vistoso ocello scuro, ovale, di colore variabile dal blu al nero, seguito in genere da una seconda macchia di pari tonalità, ma più piccola e dalla forma più irregolare. L'occhio è grande, piuttosto sporgente, ed è attraversato da una banda nera verticale che si estende dalla fronte fino alla gola. Bocca carnosa, lievemente rivolta verso il basso.

Mikrogeophagus altispinosus

Scritto da Andrea Perotti

Giovedì 29 Marzo 2012 00:11 - Ultimo aggiornamento Giovedì 29 Marzo 2012 21:47



[Echinodorus Ozelot](#)

