

## Epiplatys dageti

Scritto da Andrea Perotti

Domenica 26 Giugno 2011 23:48 - Ultimo aggiornamento Domenica 26 Giugno 2011 23:51

---

**{qluetip title=[ [Epiplatys dageti](#) ]}**



**{/qluetip}**  
(Poll, 1953)



## Epiplatys dageti

Scritto da Andrea Perotti

Domenica 26 Giugno 2011 23:48 - Ultimo aggiornamento Domenica 26 Giugno 2011 23:51

---

Piccolo pesce africano di superficie. Ama vivere in piccoli gruppetti a sessi misti, in acquari con superficie poco mossa e molto piantumati, ma con zone di riparo dalla luce diretta, di cui non è amante. Adatto all'acquario di comunità. Difficoltà d'allevamento: media.



Nome scientifico:

*Epiplatys dageti*



Sinonimi:

*Epiplatys chaperi*



*Aplocheilus dageti*



Nomi comuni:

Killi bocca di fuoco

Panchax dalla bocca di fuoco

Redchin panchax

Red chinned Panchax

Fire mouth killi

Famiglia:

Nothobranchiidae

## Epiplatys dageti

Scritto da Andrea Perotti

Domenica 26 Giugno 2011 23:48 - Ultimo aggiornamento Domenica 26 Giugno 2011 23:51

---

### Note tassonomiche:

l'intero Genere *Epiplatys* fu inizialmente inserito nella Famiglia *Aplocheilidae*, tuttavia in seguito grazie a studi più approfonditi merito di tecnologie più avanzate il Genere venne spostato nella Famiglia *Cyprinodontidae* ed infine quindi nella Famiglia *Nothobranchiidae*.

### Luogo d'origine:

Africa occidentale (rinvenibile in Liberia, Sierra Leone, Costa D'Avorio e Ghana).

### Morfologia:

corpo snello, affusolato e longilineo, con profilo dorsale quasi lineare e pinna dorsale molto arretrata. Peduncolo caudale allungato, muso appuntito con bocca ampia e rivolta leggermente verso l'alto. Occhi grandi e in posizione molto avanzata. Pinna caudale ben sviluppata e arrotondata, pinne pettorali, dorsale ed anale sviluppate più verticalmente che orizzontalmente. Corpo con livrea di fondo color grigio/argenteo, con presenza di lievi riflessi iridescenti turchesi, gialli e verdi, ed attraversato da alcune bande verticali color grigio scuro equidistanti tra loro, ma non sempre ben visibili. Nei maschi in periodo riproduttivo possono comparire delle macchiette rossastre sui fianchi e la zona della gola tende a colorarsi di un intenso color rosso fuoco. Dorso color giallo/verde. Le pinne sono tutte quasi trasparenti, ma con una leggera tonalità giallo/verde, anche azzurrognola a volte per le pettorali. Le colorazioni possono comunque variare un pochino a seconda delle specifiche zone originarie di provenienza, ed inoltre l'intensità delle tonalità dipende molto dalla condizione di salute, dall'alimentazione, e dall'attività riproduttiva.

A tal proposito è doveroso ricordare che appunto si possono incontrare differenze di livrea anche piuttosto notevoli al variare delle zone di prelevamento, in particolare si è notato che gli esemplari prelevati in alcune zone della Liberia presentano 6 bande scure verticali, contro le 5 solitamente riscontrate in questa specie, inoltre in questi esemplari della Liberia il rossore della gola appare con più facilità e con maggiore intensità, da queste considerazioni è nata la decisione di dividere la specie in due sottospecie:

## Epiplatys dageti

Scritto da Andrea Perotti

Domenica 26 Giugno 2011 23:48 - Ultimo aggiornamento Domenica 26 Giugno 2011 23:51

---

- *{qluetip title=[ [Epiplatys dageti](#) ]}*



*{/qluetip} dageti* (Poll, 1953), che presenta 5 bande scure verticali ed un'intensità di rosso a livello della gola meno marcato

- *{qluetip title=[ [Epiplatys dageti](#) ]}*



*{/qluetip} monroviae* (Daget & Arnoult, 1964), che presenta 6 bande scure verticali ed un'intensità di rosso a livello della gola più marcato

A parte queste differenze, che spesso si riescono a cogliere appieno solo in esemplari sessualmente maturi ed in piena fase riproduttiva, le due sottospecie sono praticamente identiche sia dal punto di vista morfologico che comportamentale.

Gli esemplari mostrati in questa scheda dovrebbero essere *{qluetip title=[ [Epiplatys dageti](#) ]}*



*{/qluetip} monroviae*, più diffusi a livello commerciale acquariofilo, ma il condizionale è d'obbligo trattandosi di esemplari molto giovani e tenuti a sessi separati, quindi con livrea poco marcata causa assenza di attività riproduttiva.

Dimorfismo sessuale:

i maschi presentano tonalità leggermente più marcate, tale differenza si accentua quando più maschi si trovano a confrontarsi in presenza di una o più femmine sessualmente mature, in tale situazione la differenza di tonalità tra maschi e femmine diviene piuttosto marcata e nei maschi fa la sua comparsa una colorazione rossastra in corrispondenza della gola. Altre differenze si apprezzano nelle pinne anale e dorsale, che nei maschi presentano raggi più lunghi ed una bordatura nera sulla sola anale, ed infine nella caudale, che nei maschi è leggermente bipolata, con i raggi più esterni allungati e colorati di nero, mentre nelle femmine è più tondeggianti e meno colorata.

## Epiplatys dageti

Scritto da Andrea Perotti

Domenica 26 Giugno 2011 23:48 - Ultimo aggiornamento Domenica 26 Giugno 2011 23:51

---



[Poecilia reticulata](#)

## Epiplatys dageti

Scritto da Andrea Perotti

Domenica 26 Giugno 2011 23:48 - Ultimo aggiornamento Domenica 26 Giugno 2011 23:51

---



~~Il nome di questo pesce è stato dato in onore del re Daget di Etiopia. È un pesce di acqua dolce che vive in laghi e fiumi della regione del Congo. È un pesce di acqua dolce che vive in laghi e fiumi della regione del Congo. È un pesce di acqua dolce che vive in laghi e fiumi della regione del Congo.~~