

## Theodoxus fluviatilis

Scritto da Andrea Perotti  
Martedì 12 Giugno 2012 17:37 -

---

**{qluetip title=[ [Theodoxus fluviatilis](#) ]}**



**{/qluetip}**

(Linnaeus, 1758)



## Theodoxus fluviatilis

Scritto da Andrea Perotti


Martedì 12 Giugno 2012 17:37 -

---

Piccolo gasteropode ampiamente diffuso in tutta Europa e nell'Asia sud-occidentale. Per vivere bene necessita di acqua basica e non troppo tenera, di fondi rocciosi e di costante presenza di diatomee, suo principale alimento. Si riproduce poco risultando tutt'altro che invasiva e non rovina le piante. Ospite ideale per allestimenti d'acqua fredda o a clima temperato, inadatto invece all'acquario tropicale a causa della temperatura eccessiva che ne riduce notevolmente il ciclo vitale. Specie consigliata anche a neofiti dell'acquario.

Fotogallery





Nome scientifico:

*Theodoxus fluviatilis*   
Theodoxus fluviatilis

Sinonimi:

- *Nerita fluviatilis*   
(Linnaeus, 1758) [1]
- *Theodoxus velox*   
(Anistratenko, 1999) [1]
- *Theodoxus brauneri*   
(Lindholm, 1908) [1]
- *Theodoxus lutetianus*   
(Montfort, 1810) [1]

Sottospecie:

- *Theodoxus fluviatilis*   
*fluviatilis* (Linnaeus, 1789) [1]
- *Theodoxus fluviatilis*   
*fluviatilis fontinalis* (Brard, 1815) [1]
- *Theodoxus fluviatilis*   
*littoralis* (Linnaeus, 1789) [1]
- *Theodoxus fluviatilis* 


## Theodoxus fluviatilis

Scritto da Andrea Perotti

Martedì 12 Giugno 2012 17:37 -

---


*sardous* (Menke, 1830) [1][5]

- *Theodoxus fluviatilis* 


*subthermalis* (Issel, 1865) [1][5]

- *Theodoxus fluviatilis* 

*thermalis* (Dupuy, 1851) [1][5]

- *Theodoxus fluviatilis* 

*transversetaeniatus* (AJ Wagner, 1928) [1][5]

- *Theodoxus fluviatilis* 

*dalmaticus* [1]

- *Theodoxus fluviatilis* 

*eusino* (Clessin, 1885) [1]

Nomi comuni:

River Nerite

Famiglia:

Neritidae

Origine e distribuzione:

*Theodoxus fluviatilis* 

ha la distribuzione più ampia tra tutte le specie del genere *Theodoxus* [1]. E' diffusa in tutta Europa (ad eccezione delle Alpi e della Norvegia) e in Asia sud-occidentale [1]

. A causa principalmente dell'inquinamento, ma anche dell'inserimento di specie esotiche predatrici/concorrenziali e del riscaldamento globale terrestre, la specie è in forte regressione e a rischio di estinzione in Germania, Svizzera, penisola iberica e Rep. Ceca [1]

, così pure in Olanda, Slovenia e Lettonia (ove è stata dichiarata specie protetta) [3]

. Rinvenibile anche in Iraq e negli altopiani iraniani [5]

.

Morfologia:

## Theodoxus fluviatilis

Scritto da Andrea Perotti

Martedì 12 Giugno 2012 17:37 -

---

si tratta di un piccola lumaca dotata di spessa chiocciola opercolata, e con una branchia [1]. La conchiglia, emisferica e con cuspidi basso

[4]

, è fortemente calcificata e con tre spirali

[1]

, delle quali l'ultima molto più ampia rispetto alle altre

[2][4]

, fino a rappresentarne il 95% dell'intero guscio

[4]

. Le suture sono di profondità variabile e l'apertura è a forma di "D"

[4]

.

Una particolarità di questa specie è rappresentata dal fenomeno d'assorbimento delle pareti interne del guscio, il che consente un progressivo aumento dello spazio disponibile all'interno del guscio man mano che l'animale cresce [3]. Questo fenomeno di assorbimento permette anche di lasciare più spazio a disposizione per l'assunzione di cibo

[3]

.

In termini di livrea la conchiglia si presenta essenzialmente di colore biancastro o giallastro scuro, con motivi reticolati di varie forme e colori, a volte in parte in bande, a volte in modo più uniforme, tutte variazioni comunque legate ad adattamenti a differenti fattori ambientali [1]. La conchiglia può presentarsi parzialmente corrosa

[1]

.

La lunghezza della conchiglia è in genere 5-9 mm [1][3][4], ma può anche arrivare fino a 11 mm, raramente fino a 13 mm [1].

L'altezza della conchiglia è 4-7 mm

[1]

. Gli esemplari delle popolazioni d'acqua salmastra/marina presentano in genere dimensioni minori e colorazioni della conchiglia decisamente più scure, spesso tendenti al nero

[3]

.

L'opercolo è duro, piatto, proteico e di colore in genere rosso chiaro con nervature larghe, margine rosso [3] e senza apofisi [1].

# Theodoxus fluviatilis

Scritto da Andrea Perotti  
Martedì 12 Giugno 2012 17:37 -

---



[Theodoxus fluviatilis](#)

[Radix badi](#)

[Tetraodon lineatus](#)

[Radda badi](#)

